



LA SEDUCCION DEL BUSTO FEMININO

ES UN HECHO COMPROBADO QUE LOS SENOS SON UNA DE LAS ARMAS DE SEDUCCIÓN MÁS IMPORTANTES DE CUALQUIER MUJER. SON, SIN EXCEPCIÓN, UNO DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA FEMINIDAD

Un pecho bonito no permanece perfecto indefinidamente, tan sólo una decena de años como mucho. En la mayoría de los casos, después del primer embarazo suelen dar la impresión de estar vacíos y caídos.

En los casos en que el pecho es pequeño o está poco desarrollado, la necesidad de sentirse completamente femenina, segura de sí misma y seductora, aparece a finales de la adolescencia. La presión ejercida por los medios de comunicación que cada día bombardean a las jóvenes con imágenes de supermodelos, sólo refuerza la creencia de que existe la necesidad de corregir quirúrgicamente las injusticias físicas de la madre naturaleza.

Con la llegada de la madurez y a medida que el cuerpo experimenta los desagradables cambios relacionados con el paso del tiempo, los senos se convierten en la mayor preocupación de la mujer que desea retrasar en ellos los efectos del envejecimiento.

DISTINTAS OPCIONES PARA TENER UN BUSTO BONITO.

Como en cualquier otro tipo de intervención quirúrgica de estética, la primera consulta con el especialista de cirugía plástica, reparadora y estética, es una fase esencial. Se trata de determinar si los implantes serán tolerados y también de comprobar si la salud del paciente y sus antecedentes médicos permitirán llevar a cabo una intervención.

Una vez comprobados estos puntos es cuando será posible elegir el tipo de implante que se utilizará y que puede ser de varias clases, por ejemplo de silicona líquida con una membrana lisa o rugosa, de hidrogel, o incluso, implantes anatómicos de gel cohesivo o semi-cohesivo.


El tipo de implante elegido determinará el resultado final. Los implantes anatómicos se deforman menos fácilmente aunque, suponen una cicatriz de mayor tamaño. Es posible aprovechar los contornos de las aureolas si son lo bastante grandes para insertar en ellas pequeños implantes anatómicos, o incluso la línea sub-mamaria, es decir, el pliegue inferior de los pechos para colocar implantes anatómicos de mayor tamaño.

En resumen, actualmente existen muchas técnicas de gran precisión para determinar la forma y las dimensiones de los implantes anatómicos. La intervención puede realizarse planeando anestesia general, local o bajo sedación. En estos casos el paciente puede abandonar la clínica transcurrida una o dos horas de su operación.

En la mayoría de los casos, la cirugía y los implantes mamarios procuran una nueva comodidad a la mujer, al conseguir aumentar la seguridad en ellas mismas y en su poder de seducción.

Cuando la mayoría de la gente piensa en la cirugía plástica, piensa inmediatamente en implantes mamarios. Quizás sea porque es la faceta más conocida de la cirugía estética en la cultura popular, con tantas celebridades que se la han practicado apareciendo en periódicos y revistas y que confían en mejorar su carrera gracias a la cirugía mamaria. En Marbella Clinic, esta cirugía es uno de los muchos tratamientos disponibles, pudiendo hacer tanto reducciones como implantes. El Dr. Pierre Albrecht, cirujano estético especialista de Marbella Clinic, nos explica una nueva técnica que se está empleando en el centro con gran éxito:

“Desde hace casi un año, operamos de forma que damos a elegir a las mujeres implantes que realmente se adaptan al cuerpo femenino”, comenta el Dr. Albrecht. “Antes de utilizar esta nueva técnica, los cirujanos utilizaban cualquier implante que pensaban se adaptaría correctamente, basándose tanto en su experiencia como en los deseos del paciente. No obstante, existe una forma natural y científica de elegir la forma y el volumen de un implante. Podemos tomar medidas de los huesos, de las caderas, de los pliegues mamarios de los hombros y esto determinará exactamente si debemos usar un implante de forma redonda o uno anatómico. El resultado es una mejora total en el aspecto del busto de cada mujer en particular. Este es nuestro mayor adelanto, conseguir que el cien por cien de nuestras pacientes estén satisfechas y sabemos que lo están en su totalidad porque recomiendan nuestra Clínica a sus amigos y familiares”.



Actualmente las prótesis más fiables son las de gel de silicona semicohesivo

con la pared rugosa, porque son las que mejor consistencia tienen y ofrecen un resultado más natural en cuanto a forma y tacto. Dentro de éstas hay varios tipos : anatómicas, que en determinadas circunstancias "reconstruyen" la mama dándoles una forma adecuada.

Las de suero no las aconsejo ya que pueden desinflarse y no dan una consistencia natural a la mama. Se han realizado numerosos estudios que han demostrado que las mujeres con prótesis no padecen más cáncer o enfermedades inmunológicas que las mujeres sin ellas, pueden embarazarse y dar lactancia natural a su hijo. No se ha demostrado que pase silicona a la leche.



Un problema que puede presentarse es la llamada "contractura capsular"; afortunadamente a lo largo de mi experiencia puedo decir que ésta se produce en muy raras ocasiones. Existen algunos factores que predisponen la aparición de esta cicatriz dura alrededor de las prótesis: hematoma, contaminación bacteriana, etc, por lo que administramos antibióticos profilácticos vía oral.

Existen varias técnicas de acceso: la axilar, areolar, submamaria y umbilical, entre otras; con las que las cicatrices quedan casi invisibles.

En nuestra Clínica utilizamos preferentemente la Anestesia local con sedación, aunque eventualmente podemos utilizar alguna otra técnica.

El tiempo quirúrgico de la intervención oscila entre una hora y media y dos horas.

Esta cirugía se maneja de manera ambulatoria, con lo cual la paciente podrá abandonar

la clínica el mismo día con un vendaje compresivo que se retirará al siguiente día. La evolución post-quirúrgica es minuciosamente supervisada en nuestra Clínica.

Los resultados obtenidos son inmediatos, los primeros 3 a 4 días es indicado reposo; después de este tiempo usualmente la mujer puede conducir y volver al trabajo. Eso si se ha de evitar realizar esfuerzos o coger pesos durante 15 días. Cabe mencionar que esta es una de las cirugías que más contribuye a elevar la autoestima de las pacientes, ayudándoles a sentirse más femeninas y se-

guras de sí mismas.

Los resultados obtenidos son inmediatos, los primeros 3 a 4 días es indicado reposo; después de este tiempo usualmente la mujer puede conducir y volver al trabajo. Eso si hay que evitar esfuerzos o pesos durante 15 días. Cabe mencionar que esta es una de las cirugías que más contribuye a elevar la autoestima de las pacientes, ayudándoles a sentirse más femeninas y seguras de sí mismas.